

<i>Plný název analytu</i>	Orální glukózový toleranční test; oGTT
<i>Vyšetřovaný biologický materiál</i>	venózní krev (plazma)
<i>Odebírá se</i>	krev
<i>Druh odběru</i>	venózní nesrážlivá krev
<i>Odběr</i>	1. <i>odběr</i> : ráno v 6 hodin na lačno – provádí se ze žíly. Následně pacient vypije 75 g glukózy rozpuštěné ve 250 ml vody. 2. <i>odběr</i> : za 2 hodiny – opět ze žíly. Mezi odběry pacient sedí v klidu, nekouří, nejí, nepije.
<i>Příprava pacienta před odběrem</i>	3 dny před vyšetřením oGTT po obědě sladký zákusek (např. Tatranka), jinak běžný režim den před vyšetřením v 17 hodin lehká večeře bez sladkého jídla, pak už nejíst, pouze pít hořký čaj nebo vodu – nepít minerálky!
<i>Skladování před transportem</i>	co nejdříve dopravit do laboratoře
<i>Referenční interval</i>	viz. doporučení České společnosti klinické biochemie a České diabetologické společnosti – komplexní přístup k hodnocení. <i>Zdroj: https://www.cskb.cz/wp-content/uploads/2020/11/DM_doporuceni-revize-2020.pdf</i>
<i>Interpretace</i>	<ul style="list-style-type: none"> • oGTT se používá k potvrzení dg. diabetes mellitus v případě, že dg. není jednoznačně potvrzena opakovaným nálezem glykémie na lačno $\geq 7,00$ mmol/L • při porušené glykémii na lačno (mezi 5,60 – 6,99 mmol/L) • tam, kde je glykémie na lačno $< 5,60$ mmol/L, ale je vysloveno podezření na porušenou glukózovou toleranci při předchozích vyšetřeních • jde-li o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu • u těhotných – viz Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství
<i>Dostupnost vyšetření</i>	rutinní

https://www.cskb.cz/wp-content/uploads/2020/11/DM_doporuceni-revize-2020.pdf